

PRIMA DELL'USO**LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

**BETADINE 10 % soluzione vaginale
Iodopovidone****CHE COSA E'**

Betadine 10% soluzione vaginale è un antinfettivo e antisettico ginecologico.

PERCHE' SI USA

Betadine 10% soluzione vaginale si usa come disinfettante della mucosa vaginale.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Betadine 10% soluzione vaginale non deve essere usato in caso di ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti e ai derivati dello iodio.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

In gravidanza il medicinale deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

PRECAUZIONI PER L'USO

Interrompere il trattamento almeno 10 giorni prima di una scintigrafia con iodio marcato (esame per valutare la funzionalità tiroidea).

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Evitare l'uso contemporaneo di soluzioni o saponi a base di mercurio per l'incompatibilità con lo iodio. Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'uso del prodotto, specie se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento ed instaurare idonee misure terapeutiche.

COME USARE QUESTO MEDICINALE**Quanto**

Irrigazioni: eseguire l'irrigazione vaginale 1 o 2 volte al giorno utilizzando il prodotto diluito (vedi oltre).

Pennellature su cervice e vagina: utilizzare il prodotto puro

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento. Dopo un congruo periodo di tempo senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Come

Per l'irrigazione vaginale diluire 2 cucchiaini di soluzione in ½ litro di acqua tiepida.

COSA FARE SE AVETE USATO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

Trattandosi di una applicazione locale tramite irrigazione vaginale o pennellatura, un eventuale sovradosaggio non provoca disturbi di sorta.

EFFETTI INDESIDERATI

Non riscontrati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. In caso di comparsa, gli effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (Modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Conservare al riparo dal calore.

Attenzione: non usare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale: pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE

1 flacone da 125 ml contiene:

principio attivo: iodopovidone (al 10% di iodio) g. 12,5

eccipienti: dodecilglucoside, macrogol laurilettere, profumo per igiene intima, acqua depurata.

COME SI PRESENTA

Betadine 10% soluzione vaginale si presenta in forma di soluzione per uso vaginale.

Il contenuto della confezione è di 1 flacone da 125 ml

TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO

Meda Pharma S.p.A. – Via Felice Casati, 20– 20124 Milano

Licenza Mundipharma – Basilea (Svizzera)

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

Meda Manufacturing – Mérignac (Francia)

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Luglio 2007